



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ
Târgu-Mureș, str.Gh. Marinescu, nr.50, Cod 540136
Telefon 0265215146, fax 0265212344,
e-mail secretariat@aspms.ro, www.aspms.ro
Cod fiscal 4322904
Operator date cu caracter personal nr. 35703

COMPARTIMENT EVALUARE ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII

Târgu-Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, Cod 540136
Tel/ Fax: 0265-250131
E-mail: promovare@aspms.ro

Beneficiile vaccinului împotriva rujeolei

Rujeola (pojarul) este o infecție virală extrem de contagioasă, fiind cauzată de virusul rujeolic.

Virusul se răspândește cel mai frecvent de la persoana bolnavă prin: strănut, tuse, vorbire, cel mai adesea în perioada de incubație a bolii, atunci când pacientul nu știe că este bolnav și nu prezintă nici un simptom.

Primele semne ale bolii apar de obicei între 8-12 zile de la expunerea la virus.

Boala debutează cu febră (38°C sau mai mare), rinoree (surgerea de secreții de la nivelul nasului), strănut, senzația de gât uscat, tuse persistentă, creșterea în volum a ganglionilor latero-cervicali, diaree, oboseală, inapetență (pierderea poftei de mâncare), uneori poate apărea și o lăcrimare discretă.

Această simptomatologie se întinde pe o perioadă cuprinsă între 3 și 5 zile. Spre sfârșitul acestei faze apare pe mucoasa bucală o erupție sub forma unor puncte roșii cu un centru mic de culoare gri, denumită semnul Koplik.

Erupția dispare în aproximativ 18 ore și în locul ei apare erupția tipică de rujeolă, mai întâi la nivelul feței și în spatele urechilor pentru a se răspândi apoi pe întregul corp. Este însoțită, de obicei, de febră până la 40°C sau mai mult, dar care scade în următoarele 2 zile. După aproximativ 5 zile erupția dispare. Bolnavul este contagios cu 4 zile înainte de apariția erupțiilor cutanate tipice și încă 4 zile după aceea.

La primele simptome, părintii să apeleze de urgență la medic pentru prescrierea tratamentului adecvat bolii și prevenirea complicațiilor acesteia, printre care: penumonia, diareea, otita medie, encefalita și decesul.

Vaccinarea reduce riscul de infecție acționând împreună cu mecanismele de apărare ale organismului pentru a crea, fără riscuri, o imunitate împotriva bolii.

Vaccinarea este cel mai important act de prevenție în apariția principalelor boli transmisibile, care trebuie efectuată conform Calendarului de Vaccinare prevăzut în Programul Național de Vaccinare. Se vaccinează copiii cu vîrstă între 9 – 11 luni; 1 – 4 ani nevaccinați și 5 – 14 ani nevaccinați, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 4128/2023. De obicei se folosește un vaccin triplu (vaccinul ROR – rujeolă, oreon, rubeolă) care conferă protecție pentru rujeolă, oreon (parotidită epidemică) și rubeolă.

Recomandăm tuturor părintilor să se prezinte la medicul de familie pentru vaccinarea copiilor, pentru a asigura păstrarea stării de sănătate a acestora.